

第19期福井糖尿病療養指導担当者教育講習会 5月講義施行ミニテスト

解答は解答用紙に記入してください。

以下の各文について、正しい文には○印、間違いのある文には×印を付けなさい。

- 1 糖尿病性ケトアシドーシスは、血糖値に比例して上昇するケトン体、特に 3-ヒドロキシ酪酸を尿中テストテープ(ケトスティック)を用いて診断する。
- 2 高血糖高浸透圧症候群では、高血糖の程度は著しく高いが、インスリン投与量はケトアシドーシスより少量でもよい場合が多い。
- 3 緊急手術を除き、手術前の血糖コントロール目標は、空腹時 120～140mg/dl、食後随時血糖 200mg/dl 以下、HbA1c7.5%以下とされる。
- 4 糖尿病黄斑浮腫の治療に用いる注射薬は、抗 VEGF 抗体とステロイド剤がある。
- 5 糖尿病腎症における透析導入基準は、腎機能、臨床症状、のほか患者個人個人の日常生活の障害度が加味されている
- 6 蛍光眼底検査に用いるフルオレセインは、CT や血管造影に用いるヨード造影剤と同様急性腎不全を引き起こす可能性がある。
- 7 神経障害性疼痛に使用されることが多くなってきたリリカ®(プレガバリン)は、ロキソプロフェンなどと同じ、NSAID と呼ばれる種類の薬剤である。
- 8 糖尿病と診断されている場合の LDL-C 管理目標は、一般に 120mg/dl 未満とされる。
- 9 足内における動静脈シャントが開大することによって、足背静脈が拡張し、皮膚毛細血管血流が増大して足皮膚は充血する。

解答欄

1	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	7	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	8	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	9	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>		