

第18期福井糖尿病療養指導担当者教育講習会 9月講義施行ミニテスト

以下の各文について、正しい文には○印、間違いのある文には×印を付けなさい。

- 1 カーボカウントを実行するにあたり、糖質/インスリン比(ICR)が10なら、炭水化物を30g摂取するときに必要なと考えられるボーラスインスリンは3単位である。
- 2 1型糖尿病患者の学童で、学校給食で摂取する量の制限は不要である。
- 3 2型糖尿病患者の学童では、非肥満の場合でも学校給食で摂取する量の制限は必要になる。
- 4 妊娠糖尿病(GDM)の診断基準は、75gOGTTにおいて、空腹時血糖92mg/dl以上、および、2時間値153mg/dlである。
- 5 糖尿病合併妊娠などともと代謝異常がある妊婦の場合、妊娠中は特に高脂血症が悪化するので、スタチン・フィbrate製剤は継続すべきである。
- 6 FDA(アメリカ食品医薬品局)による薬剤胎児危険度分類に基づけば、妊婦に使用するのは、超速効型インスリンではインスリンリスプロ、時効型はインスリンデテムル、が推奨される。
- 7 療養指導は全体として評価されねばならないが、その目的は、指導による効果の確認をしなければならないことに尽きる。
- 8 対象患者の血糖コントロール状態の評価項目として、尿糖は簡単に検査もできて非常に有用である。
- 9 QOL 調査票の重要な条件として、理解しやすく、日常診療に還元できる、ということのほか、再現性がある、という点がある。

解答欄

1	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	7	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	8	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	9	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>		